DIRECTEUR-GÉRANT A. FARGEIX - Nº 240

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME, HAUTE-VIENNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative, rue Pélissier, 63034 Clermont Ferrand Cedex Téléphone (73) 92-42-68 - Poste 469

BULLETIN N° 14 DU 18 MAI 1982 - EDITION GENERALE

ABONNEMENT ANNUEL :

85,00 F

Régie de Recettes de la D.D.A. Sous-Régisseur de Recettes du Service de la Protection des Végétaux Cité Administrative - Rue Pelissier

63034 Clermont Ferrand Cedex C. C. P. Clermont-Ferrand 5.503-17

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POMMIER ET DU POIRIER

En raison du temps perturbé, il est conseillé de renouveler la protection dans les prochains jours.

Les périthèces contenus dans les feuilles touchées à l'automne n'ont pas pu émettre d'ascospores en raison de la période sèche que nous avons connue, mais les émissions peuvent être importantes en cas de périodes orageuses.

- OIDIUM DU POMMIER

Ce champignon se développe même sans pluie, il y a lieu de ne pas négliger la lutte contre cette maladie.

- MINEUSES DES FEUILLES (Stigmella mallela)

Les premières captures ont débuté le 12 Mai, dans la région de SAINT-SANDOUX (Puy-de-Dôme).

Les conditions climatiques chaudes ont permis de constater des prises importantes.

Il est conseillé d'effectuer un traitement contre ces ravageurs en utilisant le diflubenzuron (DIMILIN) ou le méthomyl (LANNATE).

- CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Le premier vol a débuté en cage d'élevage le

7 Mai à la Station de MARMILHAT.

Les premières captures ont été notées le 12 Mai à SAINT-SANDOUX, CEBAZAT et VEYRE-MONTON (Puy-de-Dôme).

Il est encore trop tôt pour intervenir.

- BACTERIOSE DU NOYER

Poursuivre la lutte contre cette maladie en utilisant un produit à base de cuivre à la dose de 150 g de cuivre métal par hl d'eau, soit 300 g d'un produit commercial à 50 %.

P194

VIGNE

- TORDEUSES DE LA GRAPPE

Les captures deviennent de plus en plus nombreuses dans la région de LEMPDES et de PERIGNAT-LES-SARLIEVE (Puy-de-Dôme).

Attendre un prochain bulletin pour intervenir.

- MILDIOU

Pour l'instant, les risques de contaminations primaires sont pratiquement inexistants.